

## Lathund - patient med luftvägssymtom

- Följ basala hygienrutiner!
- Patient med misstänkt smittsam luftvägsinfektion ska inte dela rum, inte vistas i väntrum eller vänta/vårdas i korridor.

	Skyddsutrustning	Placering	Övrigt
Misstanke om smittsam luftvägsinfektion	Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon  Vid ökad smittrisk* används andningsskydd (FFP2/3) + visir	Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.	Vid stark misstanke om influensa ges behandling till patient i riskgrupp i väntan på provsvar. Gäller även vaccinerade.
Kvarstående misstanke om smittsam viral luftvägsinfektion efter negativt provsvar för covid-19, influensa, RS	Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon  Vid ökad smittrisk* används andningsskydd (FFP2/3) + visir	Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.	<a href="#">Misstänkt eller konstaterad viral luftvägsinfektion - exempelvis covid-19, influensa och RS - RUT-29375 (pdf)</a>
Påvisad covid-19, influensa eller RS-virus	Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon  Vid ökad smittrisk* används andningsskydd (FFP2/3) + visir	Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.	Ta ställning till behandling.  <a href="#">Misstänkt eller konstaterad viral luftvägsinfektion - exempelvis covid-19, influensa och RS - RUT-29375 (pdf)</a>

### \* Ökad smittrisk

- Långvarig vistelse på vådrummet, exempelvis vid vak.
- Nära kontakt med individer med kraftig hosta.
- Nära kontakt med patientens luftväg (exempelvis bronkoskopi, intubation/extubation, trakeostomi, hjärt- lungräddning, inducerat sputum, hostmaskin, sugning av nedre luftvägar).
- Arbete hemma hos person med konstaterad covid-19 (exempelvis ordinärt boende, särskilt boende, LSS-boende).