

Dokumenttyp Instruktion	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 8	Antal sidor 3
Dokumentägare Tomas Vilhelmsson Hygiensjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Smittskyddsläkare	Giltig fr.o.m. 2023-02-21	Giltig t.o.m. 2025-02-20

Städ- och desinfektionsschema

Gäller för: Hälso- och sjukvård

Schemat för städ- och desinfektion nedan är indelat i smittämne, punktdesinfektion vid spill, daglig städning och slutstädning. Daglig städning och slutstädning är i sin tur indelade i golv och övriga ytor.

Städ- och desinfektionsschema. Smittämnen som inte är upptagna i schemat: städning med förfuktade moppar.

Smittämne	Punktdesinfektion vid spill	Daglig städning		Slutstädning		
		Golv	Övriga ytor*	Golv	Övriga ytor*	
Blodsmitta	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72 Vid stort spill Virkon**	Förfuktade moppar	Mikrofiberduk	Förfuktade moppar. Vid blödning, slutstädning med Virkon**	Mikrofiberduk. Vid blödning, slutstädning med Virkon**	Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.
Calici- och Rotavirus	Virkon**	Förfuktade moppar	Virkon**	Virkon**	Virkon**	Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.
Clostridium difficile	<i>Kräkning/avföring:</i> Virkon** <i>Övr. kroppsvätskor:</i> Des +45 eller Des +72 kan användas som alt. för Virkon.	Förfuktade moppar	Mikrofiberduk	Virkon**	Virkon**	Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.
ESBL utan riskfaktorer ****	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72	Förfuktade moppar	Mikrofiberduk	Förfuktade moppar	Mikrofiberduk	Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.
MRSA, ESBL carba, ESBL med riskfaktorer****, multiresistent gramnegativ bakterie. (Ej ESBL).	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72.	Förfuktade moppar	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72.	Virkon**	Virkon**	Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet. Oanvänt material för engångsbruk kasseras.
VRE	<i>Kräkning/avföring:</i> Wet wipe klorduk <i>Övr. kroppsvätskor:</i> Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72.	Förfuktade moppar	Daglig städning med ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72.	Slutenvård: Actichlor Plus*** Poliklinisk/dagvård: Kontakttytor och toalett avtorkas med ytdesinfektionsmedel. Vid läckage eller vistelse >1 timme städas rum och toalett med Virkon.	Slutenvård: Wetwipe klorduk eller Actichlor Plus***	Rumsbunden städutrustning. Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet. Oanvänt material för engångsbruk kasseras.
Tarmsmitta – oklar diarré	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72. Vid stort spill Virkon**	Förfuktade moppar	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72.	Virkon**	Virkon**	Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.
Tuberkulos – Öppen smittsam	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72. Vid stort spill Virkon	Förfuktade moppar	Ytdesinfektionsmedel Des +45 eller Des +72.	Virkon**	Virkon**	Använd andningsskydd. Städstativet ska desinfekteras efter användning på rummet.

Vid all städning är den mekaniska bearbetningen viktig

- * Övriga ytor: kontaktytor som till exempel säng, sängbord, dörrhandtag, ljusknappar, överdel på skåp, sängbord, spolknopp, handfat och kranar på handfat och dusch, hjälpmedel.
- ** Virkon: Blandad Virkonlösning är hållbar 5 dygn enligt tillverkaren.
- *** Spädning av Actichlor Plus. Använd handskar. Fyll först på **kallt** vatten och lägg sedan i en tablett. Det tar 10–15 minuter innan tabletten är upplöst. Om varmt vatten används kan en viss gasbildning ske. Färdig lösning har en hållbarhet på 24 timmar.
- **** Riskfaktorer:
 - diarré
 - drän och andra penetrerande slangar inkl. pyelostomi
 - omläggningsskrävande sår
 - stomi
 - tracheostomi
 - utbredda eksem/fjällande hudsjukdom

Dokumentet är utarbetat av: Tomas Vilhelmsson