

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Vaccination Värmland	Version 6	Antal sidor 2
Dokumentägare Eric Le Brasseur Medicinskt ledningsansvarig Vaccination Värmland	Fastställare Birgitta Sahlström Verksamhetschef	Giltig fr.o.m. 2023-01-19	Giltig t.o.m. 2025-01-18

# Vaccination av gravida mot covid-19 och säsongsinfluensa

**Gäller för:** Vaccination Värmland,

## Vaccination mot covid-19

Alla gravida rekommenderas vaccination med mRNA-vaccin mot covid-19 efter graviditetsvecka 12.

För personer som är 30 år eller yngre är endast *Comirnaty* (Pfizer/BioNTech) godkänt.

Tidsbokning sker via nätet eller telefonbokning. Vid bokning samt på vaccinationsmottagning säkerställs att vaccinationen sker efter graviditetsvecka 12.

Gravida som påbörjat vaccination innan graviditeten, eller innan graviditeten blev känd, kan vaccineras med dos 2 med rekommenderat tidsintervall även om dos 2 infaller under första trimestern.

## Vaccination mot covid-19 av gravida under första trimestern

Ställningstagande till vaccination före graviditetsvecka 12 sker av läkare på specialistmödravården, som skriver remiss till Vaccination Värmland. Remissmallen *Vaccination mot covid-19* ska användas, val *Vaccination mot covid-19 under graviditet*.

Det gäller tidigare ovaccinerade gravida med ytterligare riskfaktorer, som till exempel fetma, högt blodtryck, diabetes och ålder över 35 år.

## Vaccination mot säsongsinfluensa

Gravida har förhöjd risk för att bli svårt sjuka om de får influensa. Vaccination skyddar både den gravida, fostret och det nyfödda barnet.

Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 12 under influensasäsong.

### Gravida i riskgrupp

För gravida som tillhör en medicinsk riskgrupp rekommenderas vaccination innan vecka 12. Detta gäller gravida som har:

- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom
- tillstånd som försämrar lungfunktion eller hostkraft
- kronisk lever- eller njursvikt
- diabetes
- immunosuppression

### Om samtidig vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa

Vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 kan ges samtidigt till vuxna gravida. Om ett intervall önskas eller efterfrågas ges vaccinen med 7 dagars intervall.

**Dokumentet är utarbetat av:** Eric Le Brasseur