

## Lathund - patient med luftvägssymtom

- Följ basala hygienrutiner!
- Misstänk alltid smittsam luftvägsinfektion vid luftvägssymtom och/eller feber utan annan uppenbar orsak.
- Patient med misstanke om smittsam sjukdom ska **inte dela rum, inte vistas i väntrum och inte vänta/vårdas i korridor**.
- Vid negativt provsvar för covid-19, influensa och RS och **kvarstående misstanke** om smittsam luftvägsinfektion ska patienten fortsätta vårdas i enkelrum med egen toalett och stängd dörr.
- För detaljer avseende influensabehandling: [Behandlingsrekommendation influensa \(lakemedelsverket.se\)](https://lakemedelsverket.se)

|   | Skydds-<br>utrustning                     | Placering och övriga<br>rutiner  | Övrigt   |
|---|---|--|--|
| <b>Misstänke om luftvägsvirus</b><br><br>I väntan på provsvar för covid-19, influensa, RS         | Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon       | Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.   | <b>Behandling mot influensa</b><br>Ge behandling i väntan på provsvar till patient i riskgrupp och till patient i slutenvård oavsett riskgruppsstillhörighet vid stark misstanke. Gäller även vaccinerade.   |
| <b>Kvarstående misstanke om luftvägsvirus</b> efter negativt provsvar för covid-19, influensa, RS | Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon       | Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.   |  |
| <b>Covid-19:</b><br>Dag 0–7 från symtomdebut tills smittfriförklarad                              | Andningsskydd FFP2 + visir/skyddsglasögon | Enkelrum med egen toalett och stängd dörr. <a href="#">Följ vårdhygieniska rutiner för covid-19</a>  |  |
| <b>Covid-19:</b><br>Dag 8 från symtomdebut tills smittfriförklarad                                | Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon       | Enkelrum med egen toalett och stängd dörr <a href="#">Följ vårdhygieniska rutiner för covid-19</a>   |  |
| <b>Influensa</b>  | Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon       | Enkelrum med egen toalett och stängd dörr. <a href="#">Följ vårdhygieniska rutiner för influensa</a> | <b>Behandling och profylax mot influensa</b><br>Ge behandling till patient i riskgrupp och till patient i slutenvård oavsett riskgruppsstillhörighet. Gäller även vaccinerade. Profylax till nära kontakter i riskgrupp eller exponerade patienter i slutenvård och på SÄBO kan vara aktuellt. |
| <b>RS-virus</b>   | Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon       | Enkelrum med egen toalett och stängd dörr.<br><a href="#">Följ vårdhygieniska rutiner för RS</a>     |  |